

Vanlige norske sommerfugler

Tekst og foto: Ove Bergersen

Svalestjert

Utseende

Blekgul grunnfarge med svarte ribbetegninger.
Blått bånd på bakvingens nedre del med rød øyeflekk.
Bakvingen ender i en tydelig stjert.

Vingespenn 72 -90 mm.

Lokalitet

Fuktig myr og gressenger nær vann og skog, ofte langs skogsveier. Finnes også på tørrere områder nær kysten, da ofte på syrintrær i hager.



Sitronsommerfugl

Utseende

Sitter alltid med vingene slått sammen formet som et blad. Hunnen er blek grønnhvit, hannen sitrongul. Begge har oransje midtflekker.

Vingespenn 55-60 mm.

Lokalitet

Flyr både i løv- og barskog om våren. På sensommeren finnes den ofte på dyrket mark.



Rapssommerfugl

Utseende

På oversiden er vingene hvitaktige med grå skjell og gulaktig skjær. Hunnen har mørkere tegninger enn hannene. De har også en ekstra svart flekk på forvingen. Undersiden av bakvingene er trukket opp med grønne striper.

Vingespenn 37-47 mm.

Lokalitet

Hager, fuktige enger og grøfter, skog og veikant.



Dagpåfugløyve

Utseende

Fire store øyeflekker på vingene. Disse er plassert på rødbrun bakgrunn, som også har nyanser av blått, svart, hvitt, og gult.
Undersiden er nesten svart.

Vingespenn 52-63 mm.

Lokalitet

Marker, enger og hager, veikanter og skogrydninger.



Neslesommerfugl

Utseende

Oransje og svart med en rad av blå halvmåneformete flekker rundt både for- og bakvingenes kanter. Hvitt merke øverst på hver forvinge. På undersiden er bakvingene mørke.

Vingespenn 35-52 mm.

Lokalitet

Hager, åker, eng og åpninger i skogen.



Admiral

Utseende

Knallrøde bånd tvers over forvingene, som på oversiden er svarte med hvite flekker. Bakvingene har rødoransje bånd langs kantene. På undersiden har vingene et spraglete mønster av svart, brunt og blått.

Vingespenn 52-62 mm.

Lokalitet

Marker, enger, frukthager og i blomsterrike områder.



Vanlig blåvinge

Utseende

Hannen og hunnen er ulike. Hannen har lyseblå vinger. Hunnen har blå og brune vinger med en rad av oransje flekker langs kantene. Begge kjønn har hvit rand rundt vingene og lysebrun og prikkete underside.

Vingespenn 21-33 mm.

Lokalitet

Blomsterrike enger og bakker.



Oransjegullvinge

Utseende

Hannen har ensfargede, gyldenrøde vinger med mørk bord langs kantene. Hunnen har oransje forvinger med et sterkt innslag av svarte flekker og mørke bakvinger med et oransje, bredt bånd. Grågul underside hos begge kjønn.

Vingespenn opp til 34 mm.

Lokalitet

Blomsterenger og langs veikanter.



Grønnvinge

Utseende

Brun overside. På undersiden har vingene en skinnende grønnfarge. Det går en rad med hvite flekker nedover undersiden.

Vingespenn 20-26 mm.

Lokalitet

Buskvegetasjon, åpne skogområder langs stier, myr og lynchheier.



Aglajaperlemorvinge

Utseende

Oransjebrun overside med svarte streker og flekker. Undersiden har ovale perlemorflekker på grønn bunn.

Vingespenn 40-60 mm.

Lokalitet

Åpne steder i skogen, langs landeveier, på heier og setervoller i fjellet.



Fløyelringvinge

Utseende

Mørkebrun overside med oransje kantbånd med svarte flekker. Undersiden mørk med tre øyeringer og en hvit stripe. Hvit kant på nyklekte eksemplarer.

Vingespenn 40-50 mm.

Lokalitet

Åpent terreng helst i skogstrakter med bartrær.

